


## NARZĘDZIE DIAGNOSTYCZNE

### UWAGA!

Ten lek Erepro i Erepro Max przeznaczony jest do leczenia zaburzeń wzrodu, czyli braku możliwości uzyskania lub utrzymania sztywności prącia wystarczającej do odbycia stosunku. Ten lek jest dla Ciebie, jeżeli jesteś dorosłym (≥ 18. r. ż.) mężczyzną, a problemy ze wzrodem utrudniają Ci współżycie płciowe. Jeżeli nie spełniasz przynajmniej jednego z powyższych warunków, ten lek NIE jest dla Ciebie!

Czy stosujesz leki używane do łagodzenia objawów choroby wieńcowej (dławicy piersiowej, bólu w klatce piersiowej), których przyjmowanie wraz z lekiem Erepro i Erepro Max może <b>zagrozić</b> Twojemu życiu?		
1.	nitroglicerynę (np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit)	
2.	izosorbid (np. Effox, Mono Mack, Monosan, Olicard)	
3.	pentaerytrytol (np. Galpent, Pentaerythritol com positum)	
4.	molsidominę (np. Molsidomina WZF)	
5.	nikorandyl (np. Angedil, Nicorandil Dexcel Pharma)	
6.	sakubitril w połączeniu z walsartanem (np. Entresto, Neparvis)	
Czy stosujesz środki uwalniające tlenek azotu tzw. poppers?		
Czy stosujesz leki blokujące receptory alfa-adrenergiczne, stosowane w <b>leczeniu przerostu prostaty lub nadciśnienia</b> ? Mogą to być:		
1.	alfuzosyna (np. Alfabax)	
2.	doksazosyna (np. Cardura, Doxar)	
3.	tamsulosyna (np. Omnic)	
Czy przyjmujesz leki stosowane w <b>nadciśnieniu płucnym</b> ? Mogą to być:		
1.	riociguat (np. Adempas)	
2.	syldenafil (np. Revatio)	
Czy przyjmujesz inhibitory CYP3A4 takie jak:		
1.	sakwinawir (np. Invirase) lub rytonawir (np. Norvir), stosowany w leczeniu zakażenia HIV	
2.	itakonazol (np. Ipozumax, ItraGen, Itrax) lub ketokonazol (np. Ketoconazole HRA) stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych lub zespołu Cushinga (nadmierne wytwarzanie kortyzolu w organizmie)	
3.	erytromycynę (np. Davercin) - antybiotyk	
Czy którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy Ciebie?		
1.	zdiagnozowano u Ciebie jakąkolwiek chorobę układu krążenia (np. wada zastawki serca, kardiomiopatia, jakiegokolwiek arytmie, dysfunkcja lewej komory, ...)	
2.	przeszedłeś operację sercowo-naczyniową (np. pomostowanie, stenty, angioplastyka, ...)	
3.	masz niskie ciśnienie krwi (poniżej 90/50 mmHg)	
4.	masz wysokie ciśnienie krwi (powyżej 150/90 mmHg)	
5.	aktywność fizyczna o niskiej lub średniej intensywności powoduje silną duszność lub ból w klatce piersiowej (np. 20-minutowy szybki marsz lub wchodzenie na drugie piętro)	
6.	w ostatnich 6 miesiącach przeszedłeś zawał serca lub udar mózgu	
7.	występuje u Ciebie niestabilna dusznica bolesna lub ciężka niewydolność serca	
8.	w przeszłości doszło u Ciebie do utraty przytomności przy gwałtownej zmianie pozycji ciała	
9.	masz anatomiczną deformację prącia (zwłóknienie ciał jamistych) lub rozpoznaną chorobę Peyroniego	
10.	stosujesz już inne metody leczenia zaburzeń erekcji niż leki zawierające sildenafil	
11.	leczysz się z powodu zakażenia wirusem HIV	
12.	utraciłeś wzrok w jednym oku z powodu choroby zwanej NAION (przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego bez zapalenia tętnic)	
13.	rozpoznano u Ciebie dziedziczne zaburzenia funkcji siatkówki oka (takie jak tzw. zwyrodnienie barwnikowe)	
14.	rozpoznano u Ciebie rzadko występujące, dziedziczne nieprawidłowości dotyczące kształtu czerwonych ciałek krwi (tzw. niedokrwiłość sierpowatokrwinkową)	
15.	rozpoznano u Ciebie ciężką niewydolność funkcji wątroby	
16.	masz chorobę wrzodową	
17.	stwierdzono u Ciebie ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia)	
18.	rozpoznano u Ciebie białaczkę (choroba nowotworowa krwi)	
19.	stwierdzono u Ciebie szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego)	
20.	masz ciężką niewydolność nerek	

	TAK	NIE WIEM	NIE
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



### PAMIĘTAJ!

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz stosować lek Erepro i Erepro Max lub masz problem z doborem dawki, przed zastosowaniem leku skonsultuj się z farmaceutą.

Problemy ze wzrodem mogą być wywołane innymi lekami, które przyjmujesz lub innymi chorobami, na które cierpisz. Właściwe leczenie niektórych schorzeń może spowodować ustąpienie zaburzeń wzrodu. Występowanie zaburzeń wzrodu jest również ważną wskazówką dla lekarza, która może pomóc mu w diagnostyce niektórych chorób, w tym chorób serca. Dlatego należy poinformować lekarza najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od wystąpienia zaburzeń erekcji i rozpoczęcia przyjmowania leku Erepro i Erepro Max. Jeśli objawy zaburzeń erekcji nie ustąpią po kilku kolejnych próbach podjęcia aktywności seksualnej po przyjęciu leku Erepro i Erepro Max lub jeśli zaburzenia erekcji nasiliły się, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.